

sera **baktapur direct**

DE Gebrauchsinformation

sera baktapur direct ad us. vet., Tabletten

Zusammensetzung

Nifurpirinolum 27,6 mg

Excipients pro Compresso ad 1 g

Anwendungsgebiete

- Innere bakterielle Infektion (grampositive und gramnegative Bakterien)Symptome: schaukelnde Bewegungen, Dunkelfärbung, Fressunlust, Bauchwassersucht (aufgetriebene Bäuche, abstehende Schuppen, vorstehende Augen)
- Bakterielle Maul- und Flossenfäule, *Columnaris*-KrankheitSymptome: baumwollartiger Flaum in der Maulgegend, weiße Flossenränder bis zur Ausfaserung und völligen Zerstörung von Flossen
- Wunden und äußere Verletzungen

Gegenanzeigen/Nebenwirkungen

sera baktapur direct wird von Niederen Tieren (z. B. Korallen, Stachelhäuter) im Meerwasseraquarium nicht vertragen. Behandeln Sie die erkrankten Fische deshalb ausschließlich in einem gesonderten Gefäß. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

Zieltierarten

Arzneimittel für alle Zierfischarten gegen inneren und äußeren bakteriellen Befall für Süß- und Meerwasser. Tabletten als Zusatz zum Aquarienwasser.

Dosierung für jede Zieltierart, Art und Dauer der Anwendung

1 Tablette auf 50 l Aquarienwasser geben. Aquarium während der Behandlung gut durchlüften und nur sehr sparsam füttern. CO₂-Düngeanlage und UV-Lampen abstellen, nicht über Aktivkohle filtern. Mindestens alle zwei Tage einen Teilwasserwechsel durchführen, **sera baktapur direct** anschließend entsprechend der gewechselten Wassermenge nachdosieren. Die Behandlung 7 Tage lang, bei Bedarf auch länger, ohne Unterbrechungen durchführen. Zur restlosen Entfernung von Arzneimittelrückständen ist zwei Tage nach der letzten Dosierung eine 24-stündige Filterung über **sera super carbon** ratsam. Falls die Krankheit weit fortgeschritten ist, empfehlen wir **sera baktapur direct** im Intensiv-Kurzbad anzuwenden. Lösen Sie dazu 1 Tablette **sera baktapur direct** in einem 2-Liter-Gefäß (z. B. kleines Plastikbecken), das Sie vorher mit Aquarienwasser gefüllt haben. Setzen Sie die erkrankten Fische 30 Minuten lang in diesen Behälter und dann wieder ins Aquarium zurück. Behandeln Sie die Fische im Aquarium mit normaler Dosierung weiter. Entfernen Sie die Arzneimittelreste aus der Intensivbadlösung durch Filterung über **sera super carbon** und schütten Sie anschließend die Intensivbadlösung weg.

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern (15 – 25 °C). Vor Licht schützen. Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender: Arzneimittel für Tiere. Nicht Einnehmen. Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen: Nicht mit anderen Arzneimitteln anwenden.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien

Abgelaufene Tabletten und gebrauchte Aktivkohle dem Restmüll zuführen. Nicht ins Abwasser geben.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

17. April 2024

Weitere Angaben

Packungen zu 8 und 24 Tabletten

ATCvet code: QJ01XE91

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Swissmedic 69827

Zugelassen im Meldeverfahren.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der oben genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.