

# Canikur<sup>®</sup> Pro

Pâte orale

Aliment complémentaire diététique pour le soutien de la flore intestinale naturelle des chiens et chats.

## Composition

Huile de soja, levure inactivée, farine de lupin (riche en protéines), glucose, chlorure de sodium, phosphate disodique, huile de tournesol

## Additifs

*Enterococcus faecium* (DSM 10663/ NCIMB 10415) (stabilisateur de la flore intestinale):  $2 \times 10^{12}$  CFU/kg,  
Bentonite 1m558i (agent adsorbant): 16,5 %

## Composants analytiques

Matières grasses brutes 41,1%  
Cendres brutes 21,1%  
Protéines brutes 6,0%  
Fibres alimentaires brutes 1,5%

Cendres insol. dans HCl 13,0%

Contient une souche de bactérie probiotique naturellement présentes dans le tractus intestinal sain. Contient aussi du Bio-Mos<sup>®</sup> - C (prébiotique), qui soutient la croissance des bactéries bénéfiques dans les intestins, et de la bentonite, un liant naturel. Bio-Mos<sup>®</sup> est une marque commerciale d'Alltech, Inc.

## Mode d'emploi / usage

### Doses recommandées

Chats:

1-2 ml deux fois par jour

### Chiots et petits chiens

(≤ 10 kg) : 2 ml deux fois par jour

### Chiens moyens

(11-25 kg) : 4 ml deux fois par jour

### Grands chiens

(26-40 kg) : 6 ml deux fois par jour

### Très grands chiens

(> 40 kg) : 8 ml deux fois par jour

Tournez l'anneau sur la seringue doseuse jusqu'au dosage souhaité et administrez la pâte Canikur<sup>®</sup> Pro dans l'écuelle ou directement dans la gueule de l'animal.

N'administrez pas plus que la dose recommandée.

Il est recommandé de remettre le capuchon sur l'embout après utilisation afin d'éviter la formation d'un bouchon de pâte sèche.

Il est recommandé de demander conseil à un vétérinaire avant utilisation.

**Durée d'utilisation** Utilisez aussi longtemps que nécessaire ou selon la recommandation du vétérinaire, mais pas pendant plus de quatre semaines.

Pour soutenir et maintenir une flore intestinale saine, en cas de risque de troubles digestifs (diarrhées), pendant et après ceux-ci. Particulièrement utile pendant les périodes de stress, de traitement antibiotique et autres troubles susceptibles de perturber la flore bactérienne naturelle de l'intestin. En raison de la capacité de la bentonite à lier les macrolides: évitez l'utilisation simultanée avec des macrolides administrés par voie orale

## Conservation

Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. À conserver en dessous de 20°C.

## Présentation

Emballage contenant 1 seringue pour administration orale à 30 ml.

## Fabricant

Boehringer Ingelheim Animal Health Reg. no : „GB2800019

## Distributeur

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

Agroscope-Registrierungsnummer :

CH 32009

12/2023